

**SOAIDS**

Dit is een publicatie van Soa Aids Nederland en is mede mogelijk gemaakt door GlaxoSmithKline. Deze folder is onderdeel van de brochure 'Soa, voorkomen-testen-behandelen'. Lees zowel de folder als de brochure zorgvuldig door als je goed op de hoogte wilt zijn. Voor meer informatie over soa en veilig vrijen kun je 24 uur per dag terecht bij de Aids Soa Infolijn (tel. 0900-2042040 of [infolijn@soaids.nl](mailto:infolijn@soaids.nl)).

Je kunt ook onze website bezoeken: [www.SoaAids.nl](http://www.SoaAids.nl)



# Chlamydia

**SOA**  
**AIDS**

[www.SoaAids.nl](http://www.SoaAids.nl)

## Chlamydia

Chlamydia is een soa (seksueel overdraagbare aandoening), die veel voorkomt. Chlamydia wordt veroorzaakt door een bacterie, die zich nestelt in de slijmvliezen van de geslachtsdelen. Hierdoor kan een ontsteking ontstaan van de urinebuis, van de anus en van de baarmoedermond. Bij een infectie in de anus zijn er meestal geen klachten. Soms is er wat bloederige afscheiding, irritatie, jeuk en pijn bij de ontlasting.

### Verschijselen bij de vrouw

Als vrouw merk je vaak niets van chlamydia. Er zijn dan helemaal geen of alleen vage klachten. Daardoor kan het gebeuren dat je lang blijft doorlopen met een chlamydia-infectie, soms wel jaren. Ondertussen kun je de ziekte ongemerkt doorgewezen. Verschijselen, die op chlamydia kunnen wijzen, zijn:

- meer of andere afscheiding dan normaal;
- pijn bij het plassen;
- abnormaal bloedverlies, bijvoorbeeld tussen twee menstruatieperioden of na het vrijen;
- pijn bij het vrijen;
- pijn in de onderbuik.

Als je onveilig hebt gevreeën en/of last hebt van één of meer van deze klachten, ga dan onmiddellijk naar een arts.

### Mogelijke gevolgen bij de vrouw

Chlamydia kan opstijgen naar de eileiders. Er ontstaat dan een eileiderontsteking, die zich kan uitbreiden naar de buikholte. Dit heet PID (Pelvic Inflammatory Disease: ontsteking in het bekkengebied). Een eileiderontsteking kan gepaard gaan met koorts. Je voelt je ziek en hebt pijn in de onderbuik. Door een snelle en goede behandeling

(antibiotica en bedrust) kan een eileiderontsteking volledig genezen. Een eileiderontsteking, die niet of te laat wordt behandeld, veroorzaakt littekens in de eileiders. Hierdoor kan de eileider verstopt raken. Dit kan leiden tot onvruchtbaarheid of buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Een zwangere vrouw kan een chlamydia tijdens de bevalling overdragen aan de baby. De baby kan dan oogontsteking of longontsteking krijgen. Door een goede behandeling tijdens de zwangerschap voorkom je het risico voor de baby.

### **Verschijselen bij de man**

Mannen krijgen vaak één tot enkele weken, nadat ze met chlamydia zijn geïnfecteerd, afscheiding uit de plasbuis. Dat hoeft niet veel te zijn. Meestal gaat het alleen om een beetje waterige afscheiding na het opstaan (ochtenddruppel). Ook kan het plassen wat pijnlijk zijn. Circa 1/4 van de besmette mannen heeft helemaal geen klachten van een chlamydia. Ook zonder (deze) klachten kan de ziekte doorgegeven worden.

### **Mogelijke gevolgen bij de man**

Ook bij mannen kan de ontsteking opstijgen. Dit komt veel minder vaak voor dan bij vrouwen. De bacteriën kunnen via de zaadleiters terechtkomen in de prostaat en de bijbal. Dit kan leiden tot een bijbalontsteking. Dat geeft heftige pijn in de balzak (scrotum), soms uitstralend naar de lies. Je voelt een zwelling in de balzak. Soms kan een ontsteking van de bijbal een ontsteking van de bal zelf veroorzaken. Ook dit veroorzaakt zwelling en pijn. Een ontsteking van de prostaat kan gepaard gaan met koorts.