

VOORKOM AIDS

DOE EEN HIV-TEST



AIDS FONDS • GIRO 8957





VOORKOM AIDS: DOE EEN HIV-TEST

De ziekte aids wordt veroorzaakt door het hiv-virus. De beste manier om aids te voorkomen is ervoor te zorgen dat u geen hiv-infectie oploopt. Het kan zijn dat u risico op overdracht van hiv heeft gelopen. Door tijdig op de hoogte te zijn van het feit dat u hiv heeft, zijn artsen in staat het juiste moment vast te stellen waarop met medicatie kan worden gestart. Hierdoor kan in veel gevallen worden voorkomen dat het hiv-virus zijn schadelijke werk doet en dat de ziekte aids zich ontwikkelt.

Omdat de meeste mensen zich in het begin van hun hiv-infectie helemaal niet ziek voelen, is er maar één manier om te ontdekken of u met hiv geïnfecteerd bent: het laten uitvoeren van een hiv-test. Testen heeft natuurlijk alleen zin als u risico heeft gelopen op overdracht van het hiv-virus. Met behulp van deze folder kunt u bepalen of u risico heeft gelopen. Verder vindt u hierin algemene informatie over hiv en aids en over de hiv-test.

| | |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| 1. Voorkom aids: doe een hiv-test | 3 |
| 2. Hiv en aids | 5 |
| Behandeling van hiv en aids | 5 |
| 3. Wat houdt een hiv-test in? | 7 |
| Wel of niet testen? | 7 |
| Risico's op een hiv-infectie | 7 |
| Wat te doen als u zeer recent risico heeft gelopen? | 8 |
| 4. Wat gebeurt er als u zich laat testen? | 9 |
| De uitslag: positief of negatief | 9 |
| Het belang van een hiv-test | 10 |
| Bedenk vooraf wel het volgende | 10 |
| Anoniem testen? | 11 |
| 5. Wat kost een hiv-test? | 12 |
| Onverzekerd of illegaal? | 12 |
| Verplicht testen? | 12 |
| Waar kunt u de test laten doen? | 13 |
| De hiv-zelftest | 13 |
| 6. Meer informatie | 14 |
| Het Aids Fonds | 16 |
| Hoe kunt u het Aids Fonds steunen? | 16 |

Hiv is de naam van het virus dat uiteindelijk aids veroorzaakt. Zodra iemand met hiv is geïnfecteerd, begint het virus het afweersysteem van het menselijk lichaam af te breken. Dit gebeurt eerst zo goed als ongemerkt, maar na verloop van tijd - soms vele jaren - krijgt men steeds ernstigere ziekteverschijnselen. Deze verschijnselen kunnen uiteindelijk leiden tot de diagnose aids. Zonder behandeling overlijden mensen aan de gevolgen hiervan.

U kunt dus zonder het te weten lange tijd hiv in uw lichaam hebben en het virus ook op anderen overdragen. Hiv wordt meestal overgedragen door onbeschermd seksueel contact (onveilig vrijen) of door het spuiten van drugs met naalden die al door anderen gebruikt zijn (via achtergebleven bloedresten). Ook kan het virus tijdens en na de zwangerschap (via borstvoeding) worden overgedragen van moeder op kind.

In landen waar hiv en aids veel voorkomen en bloed niet op hiv gecontroleerd wordt, kan het ook gebeuren dat het virus overgedragen wordt tijdens een operatie en/of via bloed en bloedproducten. In Nederland en veel andere landen worden sinds 1985 alle donorbloed en bloedproducten wel op hiv gecontroleerd.

Behandeling van hiv en aids

Een hiv-infectie is niet te genezen, maar wel te behandelen. Met een combinatie van drie of meer hiv-remmers kan de vermenigvuldiging van hiv in het lichaam sterk worden verminderd. Hierdoor leven mensen met hiv vaak langer zonder of met minder lichamelijke klachten. Het is belangrijk om tijdig met deze behandeling, de combinatietherapie, te beginnen.



Dit moet in ieder geval gebeuren voordat er ernstige ziekteverschijnselen optreden. Om te bepalen of het moment is aangebroken waarop de behandeling zou moeten starten, wordt onder meer regelmatig de hoeveelheid hiv in het bloed gemeten. Vanaf het moment dat duidelijk is dat u met hiv geïnfecteerd bent, begint de behandelend arts hiermee. Om aan te kunnen tonen dat u een hiv-infectie hebt, moet u uiteraard eerst getest zijn.

De combinatietherapie is geen gemakkelijke behandeling en vraagt het nodige van u. Maar de gezondheidswinst die het oplevert is zeker de moeite waard. Dankzij de behandeling kunnen mensen met hiv verder leven en bijvoorbeeld blijven werken. Als een hiv-infectie niet behandeld wordt, is de kans aanzienlijk groter dat er sneller ziekteverschijnselen optreden en dat men voortijdig overlijdt aan de gevolgen van aids.

Door uw bloed te laten testen op de aanwezigheid van hiv, kunt u erachter komen of u het virus in uw lichaam hebt. Mocht dat zo zijn, dan heeft uw lichaam antistoffen tegen het virus aangemaakt. Dit zijn stoffen die het lichaam normaal gesproken produceert om virussen onschadelijk te maken. Het probleem bij aids is dat de antistoffen tegen hiv het virus niet kunnen uitschakelen. De hiv-test (officieel hiv-antistoffentest) toont aan of u hiv-antistoffen in uw bloed hebt. Als dat zo is, bent u met hiv geïnfecteerd, ofwel hiv-positief.

Antistoffen tegen hiv zijn soms pas drie maanden na infectie in het bloed terug te vinden. Als u risico hebt gelopen, dan moet u dus drie maanden wachten voordat u zich laat testen. Dit kan voor uw gevoel lang duren, zeker als u zich grote zorgen maakt. U kunt zich dan bijvoorbeeld laten ondersteunen door uw huisarts, een arts of verpleegkundige van de GGD, of bellen met de Aids Soa Infolijn.

Voor alle duidelijkheid: een hiv-test toont alleen maar aan of u het virus heeft of niet en biedt geen bescherming tegen hiv.

Wel of niet testen?

Het besluit om u op hiv te laten testen gaat waarschijnlijk met veel twijfels en onzekerheden gepaard. Als u het moeilijk vindt die beslissing te nemen, is het goed om daarbij steun te zoeken. Bij iemand uit uw eigen omgeving bijvoorbeeld, of uw huisarts, een sociaal-verpleegkundige bij de GGD of via de Aids Soa Infolijn. De belangrijkste vraag die u zich moet stellen is: heb ik ooit risico gelopen, ook al was dit lang geleden? Als het antwoord daarop ja is, is het zeker aan te raden om u grondig te laten informeren, zowel over de hiv-test als de behandelmogelijkheden van hiv/aids.

Risico's op een hiv-infectie

U hebt risico gelopen wanneer u:

- onveilige seks heeft met iemand die hiv-positief is of met iemand waarvan u niet weet of die hiv-positief is.

Onveilige seks houdt in: vaginale- of anale geslachtsgemeenschap zonder gebruik van condoom, of orale seks (pijpen en beffen) waarbij sperma of (menstruatie)bloed in de mond is gekomen.

U heeft meer risico gelopen op hiv wanneer u onveilige seks heeft gehad met iemand die afkomstig is uit een land waar hiv veel voorkomt; met mannen die

seks hebben (gehad) met mannen en met druggebruikers die drugs met de injectienaald toedienen. Daarnaast neemt het risico op overdracht van hiv toe wanneer een van beide partners al een seksueel overdraagbare aandoening heeft.

Van andere risico's op overdracht van hiv kan sprake zijn:

- wanneer u drugs heeft gespoten met injectienaalden die al door anderen zijn gebruikt;
- wanneer u (per ongeluk) bent geprikt met een gebruikte injectienaald;
- wanneer u een operatie heeft gehad in een land waar hiv en aids veel voorkomen;
- tijdens de geboorte van een kind, wanneer de moeder hiv-positief is;
- wanneer een kind borstvoeding krijgt van een hiv-positieve moeder;
- wanneer u bloed of bloedproducten toegediend heeft gekregen, die niet op hiv zijn gecontroleerd. (In Nederland en veel andere landen worden sinds 1985 alle donorbloed en bloedproducten wel op hiv gecontroleerd.)

Voor meer informatie over gelopen risico kunt u het best contact opnemen met de Aids Soa Infolijn. De medewerkers van de Infolijn kunnen samen met u een risico-inschatting maken en u zonodig direct doorverwijzen naar de juiste adressen voor test of behandeling.

De Aids Soa Infolijn, 0900 - 204 204 0 of 0900 - AIDSSOA, is 24 uur per dag bereikbaar en kost 10 eurocent per minuut. Op werkdagen tussen 14.00 en 22.00 uur kunt u rechtstreeks bellen met de medewerkers van de Infolijn. Buiten die tijden kunt u ingesproken informatie beluisteren over onder andere doorverwijsadressen.

Wat te doen als u zeer recent risico gelopen heeft?

Er kan een acute situatie ontstaan waarin u grote kans loopt op een hiv-infectie. Bijvoorbeeld bij een gescheurd condoom van een hiv-positieve partner of het per ongeluk prikken aan een gebruikte injectienaald. In dat geval kunt u in aanmerking komen voor een PEP-behandeling (Post-Expositie Profylaxe). Deze behandeling met hiv-remmende medicijnen duurt een maand en is zowel lichamelijk als psychisch erg belastend. Medici gaan ervan uit dat PEP in een heel vroeg stadium de verspreiding van hiv in het lichaam kan voorkomen. Er is echter geen garantie dat PEP echt werkt.


Als u denkt zo'n risico gelopen te hebben, dient u liefst binnen enkele uren, maar uiterlijk binnen 48 - 72 uur contact op te nemen met de sociaal-verpleegkundige of arts infectieziekten van de GGD in uw regio. Zij zijn 24 uur per dag bereikbaar voor urgente situaties en kunnen samen met u een risico-inschatting maken. De PEP-kuur wordt door een internist gegeven na overleg met de GGD.

Voordat een hiv-test bijvoorbeeld via de huisarts of bij de GGD wordt gedaan, vindt er eerst een voorgesprek plaats. Daarin wordt gesproken over de aanleiding voor de test en worden voor- en nadelen op een rij gezet. U beslist dan zelf of u zich wel of niet zult laten testen. Voor een hiv-test is altijd uw uitdrukkelijke toestemming nodig.

Het duurt meestal zo'n tien dagen voordat de uitslag bekend is. Dit duurt zo lang omdat er altijd nog een bevestigingstest wordt gedaan. De uitslag wordt persoonlijk aan u meegedeeld, dus niet via de telefoon. In het nagesprek zal de arts of hulpverlener de uitslag van de test met u bespreken, evenals de eventuele gevolgen daarvan. De uitslag is geheim en mag door niemand anders dan uzelf aan anderen worden verteld. In het voor- en nagesprek kunt u met de arts of hulpverlener ook bespreken hoe u in de toekomst risico's kunt vermijden.

De uitslag: positief of negatief

Het lijkt misschien verwarrend, maar een negatieve testuitslag betekent goed nieuws: er is geen hiv in uw bloed gevonden. Als u de laatste drie maanden voor de test inderdaad geen risico meer hebt gelopen, dan kunt u ervan uitgaan dat u niet met hiv bent geïnfecteerd. Het is belangrijk dat u in het vervolg risico op infectie met hiv blijft voorkomen.



Een positieve uitslag daarentegen betekent dat er wel virus in uw bloed aanwezig is. U bent met hiv geïnfecteerd, ook al merkt u er misschien nog niets van. Het is belangrijk om uw gezondheid goed in de gaten te laten houden door uw arts. Deze zal u zo nodig doorverwijzen naar een specialist, die u goed kan begeleiden en voorlichten over de mogelijkheden om de hiv-infectie te behandelen. Ook voor psychosociale ondersteuning kan uw huisarts u doorverwijzen. En natuurlijk is het belangrijk dat u weet welke maatregelen u kunt nemen om hiv niet over te dragen op anderen.

Het belang van een hiv-test

- De hiv-test maakt een einde aan de onzekerheden waar u al enige tijd mee rondloopt. Als blijkt dat u geen hiv in het lichaam hebt, is dat een hele geruststelling.
- Maar ook als de uitslag uitwijst dat u wel bent geïnfecteerd, kan dat voor opluchting zorgen. U kunt vanaf dat moment uw gezondheid gericht laten controleren en indien nodig tijdig met de behandeling starten. Hierdoor is de kans dat u gezond blijft groter en kunt u ervoor zorgen dat hiv zo min mogelijk uw persoonlijk leven aantast.
- U kunt, als u hiv-positief en zwanger bent, met medicijnen de kans aanzienlijk verkleinen dat u het virus tijdens de zwangerschap of in de periode erna overdraagt op uw baby. Wilt u hier meer informatie over, praat dan eens met de huisarts of verloskundige. U kunt ook de folder *Testen op HIV ja of nee, informatie voor zwangere vrouwen* van de Stichting soa-bestrijding aanvragen (te bestellen via de Aids Soa Infolijn).

Bedenk vooraf wel het volgende

- Het horen van een positieve testuitslag roept vaak veel onzekerheden en vragen op. Hoe ziet mijn toekomst eruit? Moet ik het geheim houden? Hoe zullen mijn partner, familie, vrienden, collega's of werkgever reageren als ik hen de testuitslag vertel?
- De testuitslag kan het afsluiten van (levens)verzekeringen, onder andere voor een hypotheek, in de weg staan. In de gezondheidsverklaring bij deze verzekeringen wordt gevraagd of u aids heeft of hiv-positief bent. Als u dat bevestigend beantwoordt zal u meestal van verzekering worden uitgesloten of een verhoogde premie moeten betalen. Dit geldt ook voor een particuliere ziektekostenverzekering.
- Sommige landen laten mensen met hiv en aids niet toe.

Anoniem testen?

De uitslag van een hiv-test is altijd geheim. Als u niet wilt dat uw huisarts, het ziekenfonds of de ziektekostenverzekering weet dat u zich hebt laten testen, kunt u kiezen voor een anonieme test. In dat geval komt er op het buisje met bloed dat naar het laboratorium wordt gestuurd, alleen een code of valse naam te staan. Behalve uzelf en degene die het bloed afneemt, weet dus niemand anders van wie het bloed is.

U kunt zich anoniem laten testen bij de GGD of de afdeling geslachtsziekten van het ziekenhuis. Via de huisarts kan dit niet.



WAT KOST EEN HIV-TEST?

5

De kosten van een test lopen per instelling nogal uiteen. U kunt vooraf informeren naar de prijs. Als de test via de (huis)arts wordt uitgevoerd, worden de kosten door de ziektekostenverzekering of het ziekenfonds betaald. U bent dan uiteraard niet anoniem getest.

Onverzekerd of illegaal?

Ook zonder ziektekostenverzekering of geldige verblijfsvergunning kunt u zich in Nederland altijd op hiv laten testen. De uitslag van de test heeft geen invloed op uw asielaanvraag of verblijfsvergunning. Mocht u hiv-positief blijken te zijn en hebt u medische zorg nodig, dan hebt u daar recht op, ook zonder verzekering. Maar in de praktijk blijkt het soms moeilijk om die medische behandeling te krijgen. In dat geval kunt u voor advies terecht bij het Servicepunt van de Hiv Vereniging Nederland, telefoon 020 - 689 25 77, te bereiken op werkdagen van 14.00 tot 22.00 uur (eventueel anoniem).



Verplicht testen?

In Nederland is een hiv-test niet wettelijk verplicht. In ons land staat voorop dat het afnemen van een hiv-test een vrijwillige en individuele keuze is, waarvoor uw uitdrukkelijke toestemming nodig is. De hiv-test mag geen onderdeel zijn van de medische keuring bij sollicitaties, omdat mensen met hiv vaak gewoon kunnen (blijven) werken. Ook hoeft u de uitslag van een test niet aan uw werkgever mee te delen.

Voor het afsluiten van bepaalde verzekeringen is een hiv-test soms wel een voorwaarde. Dit is het geval bij (levens)verzekeringen en bij hypotheek (met levensverzekering) boven de € 146.045. Het geldt ook voor het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering vanaf € 29.210 eerstejaarsrisico en € 19.470 of meer voor latere jaren. Weigering van dat verzoek kan tot gevolg hebben dat de hypotheek of verzekering wordt geweigerd. Meer informatie hierover is verkrijgbaar bij het Servicepunt van de Hiv Vereniging.

Waar kunt u de test laten doen?

Voor een hiv-test kunt u terecht bij:

- De huisarts;
- De GGD (Gemeentelijke Geneeskundige Dienst), de meeste GGD'en hebben de mogelijkheid om een (anonieme) test te doen;
- Een aantal ziekenhuizen. Informeer eerst of het ziekenhuis in uw stad de mogelijkheid heeft om een test te laten doen via de afdeling Huid- en Geslachtsziekten;
- Soa-poliklinieken (ook anoniem). Deze zijn gevestigd in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Maastricht en Nijmegen.
- Checkpoint van de Hiv Vereniging Nederland in Amsterdam (www.hivtestnu.nl)

Voor adressen bij u in de buurt kunt u bellen met de Aids Soa Infolijn.

De hiv-zelftest

Er zijn tegenwoordig hiv-zelftests te koop waarbij u thuis zelf uw bloed of speeksel kunt testen op hiv-antistoffen. De procedures van zo'n test zijn vrij ingewikkeld en daardoor bestaat de kans dat u fouten maakt bij de uitvoering van een zelftest. Om die reden is de uitslag hiervan niet altijd even betrouwbaar. In Nederland is het gebruik van de zelftest eigenlijk niet nodig: er is altijd wel een betrouwbare testplaats bij u in de buurt. Mocht u toch voor deze testmethode kiezen, houdt dan goed rekening met het volgende:

- U dient de bijsluiter zeer aandachtig te lezen;
- Ook voor de zelftest geldt dat er minstens drie maanden verstreken moeten zijn sinds het laatste risico op hiv-infectie;
- De zelftest is nooit 100% betrouwbaar. Daarom moet u een positieve testuitslag altijd laten bevestigen bij de GGD, via de huisarts of op de afdeling geslachtsziekten van het ziekenhuis;
- Kies het moment van testen altijd zodanig dat u bij een positieve uitslag voor steun en advies bij iemand aan kunt kloppen. Realiseer u daarbij dat de meeste instanties in het weekend gesloten zijn en dat die dagen om die reden wellicht niet zo'n geschikt moment zijn om de test uit te voeren.

Het NIGZ (Nationaal Instituut voor Gezondheidsbevordering en Ziektepreventie) brengt voorlichtingsmateriaal over de hiv-test uit in andere talen. De folder 'Hiv-test: ja of nee? Informatie over de hiv-test in Nederland' is verkrijgbaar in het Frans, Engels, Spaans, Portugees, Turks, Papiaments, Arabisch en Nederlands

De folder 'Testen op hiv: ja of nee? Informatie over de hiv-test en zwangerschap' is tweetalig: Nederlands gecombineerd met Frans, Engels, Portugees, Arabisch of Somalisch. (www.nigz.nl)

De Stichting soa-bestrijding brengt de folder 'Testen op HIV ja of nee, informatie voor zwangere vrouwen' uit. (www.soa.nl)

Meer informatie over aids, infectierisico's en veilig vrijen vindt u in de brochures 'Alles over aids, antwoorden op de meest gestelde vragen' en 'Soa! Voorkomen, testen, behandelen'. Deze zijn verkrijgbaar bij GGD'en en andere gezondheidsinstellingen.

Alle folders zijn te bestellen via de Aids Soa Infolijn. Voor meer informatie en het bestellen of downloaden van de folders van het Aids Fonds kunt u ook gebruik maken van de website www.aidsfonds.nl.

Voor meer informatie over de hiv-test en met vragen over hiv en aids kunt u behalve bij uw huisarts en de GGD ook terecht bij:



- **De Aids Soa Infolijn**
0900 - 204 204 0 of 0900 - AIDSSOA (10 eurocent per minuut),
24 uur per dag bereikbaar voor informatie.
Op werkdagen van 14.00 tot 22.00 uur staan medewerkers van de Infolijn u rechtstreeks te woord. Vragen kunnen in het Nederlands en Engels worden gesteld. Ook kunt u hier folders bestellen.
- **De Aids Infolijn**
in het Turks: 0800 - 099 44 88
in het Marokkaans: 0800 - 099 22 55
in het Chinees: 0800 - 022 33 38
(Gratis informatie via een cassettebandje - 24 uur per dag)
- **Hiv Vereniging Nederland**
Landelijke belangenorganisatie voor mensen met hiv/aids en betrokkenen.
Voor informatie, belangenbehartiging en onderling contact en ondersteuning. Bereikbaar op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.
1e Helmersstraat 17
1054 CX Amsterdam
Telefoonnummer: 020 - 616 01 60
Website: www.hivnet.nl
Bij het Checkpoint van de Hiv Vereniging kunt u zich laten testen, kijk ook op www.hivtestnu.nl
- **Servicepunt Hiv Vereniging**
Hiv-positieven en betrokkenen kunnen voor individuele vragen en voor een anoniem gesprek met een andere hiv-positieve terecht bij het Servicepunt van de Hiv Vereniging: 020 - 689 25 77, te bereiken op werkdagen van 14.00 tot 22.00 uur (eventueel anoniem). Men kan hier onder andere terecht voor juridische vragen, medische vragen en vragen over activiteiten voor en door mensen met hiv (onderling contact).
- **Schorerstichting**
Vragen over homospesifieke hulpverlening bij hiv en aids. Helpdesk, geopend van maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Telefoonnummer: 020 - 662 42 06
E-mail: helpdesk@schorernet.nl
Website: www.schorer.nl

JA, IK STEUN DE STRIID TEGEN AIDS.

Dhr. Mevr.: _____

Straat: _____ Nr.: _____

Postcode: _____ Plaats: _____

Bankrekening:

Girorekening:

Ik machtig hierbij het Aids Fonds tot wederopzegging het

bedrag van € _____ van bovenstaande bank-/girorekening

af te schrijven per maand half jaar
 kwartaal jaar.

Als ik voor minimaal €25,- of meer per jaar machtig, ontvang ik de pin in de vorm van het rode lintje, het internationale symbool van solidariteit met mensen met hiv/aids.

Ik stel echter geen prijs op het rode lintje.



Ik machtig hierbij het Aids Fonds éémmalig het bedrag van

€ _____ van bovenstaande bank-/girorekening af te schrijven.

Doelbestemming preventie & voorlichting

zorg en hulp in Nederland

toegang tot behandeling

ontwikkelingslanden

vaccinontwikkeling

Datum: _____ Handtekening: _____

U kunt deze kaart ook in een ongefrankeerde envelop opsturen.

Als u het niet eens bent met de afschrijving of de machtiging wilt intrekken, kunt u schriftelijk of telefonisch contact opnemen met het Aids Fonds, telefoonnummer 020 - 62 62 669.

2002.303

Het Aids Fonds

De activiteiten van het Aids Fonds zijn gericht op het 'werken aan een wereld zonder aids'. Het Fonds levert een bijdrage aan de mondiale strijd tegen hiv en aids en mobiliseert de samenleving voor de (nationale en internationale) strijd tegen hiv en aids.

Het Aids Fonds maakt ondersteuning van mensen met hiv/aids mogelijk op medisch, psychosociaal, en maatschappelijk terrein en door directe financiële hulpverlening aan mensen met hiv. Daarnaast stimuleert het Aids Fonds preventie-activiteiten om nieuwe hiv-infecties te voorkomen.

Het Aids Fonds is opgericht in 1985. De financiële middelen zijn afkomstig uit eigen fondsenwervende activiteiten en bijdragen van het Ministerie van VWS. Het geld is bestemd voor: wetenschappelijk onderzoek, preventie en voorlichting, zorg en hulp in Nederland, toegang tot behandeling, ontwikkelingslanden, en vaccinontwikkeling.

Het Aids Fonds werkt samen met tal van uitvoerende organisaties, onderzoekers, de overheid en belangenorganisaties.

Hoe kunt u het Aids Fonds steunen?

U kunt het Aids Fonds steunen door donateur te worden of u als vrijwilliger bij het Aids Fonds aan te melden. Heeft u belangstelling? Vul dan de machtigingskaart achterin deze folder in en stuur deze op, of bel het Aids Fonds, telefoon 020 - 62 62 669. U kunt natuurlijk ook een bijdrage storten op giro 8957 of banknummer 70.70.70.228.



Postzegel
hoeft niet,
mag wel.

Stichting AIDS Fonds
Antwoordnummer 11065
1000 PB Amsterdam

DANK VOOR UW HULP

Dit is een publicatie van de Stichting AIDS Fonds
Gewijzigde herdruk augustus 2002
© Stichting AIDS Fonds



De Stichting AIDS Fonds is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van
onjuistheid of onvolledigheid van de informatie die in deze folder is opgenomen.

Ontwerp en illustraties: Stan van Oss, Doetinchem
Druk: Senefelder Misset Grafisch Bedrijf B.V., Doetinchem



**STICHTING
AIDS FONDS**

**KEIZERSGRACHT 390-392
1016 GB AMSTERDAM**

TELEFOON

020 - 62 62 669

TELEFAX

020 - 62 75 221

AIDS SOA INFOLIJN

0900 - 204 204 0 of 0900 - AIDSSOA (€ 0,10 p.m.)

E-MAIL



AIDSFONDS@AIDSFONDS.NL

INTERNET

WWW.AIDSFONDS.NL

COPYRIGHT

STICHTING AIDS FONDS, AUGUSTUS 2002



AIDS FONDS • GIRO 8957
AIDS SOA INFOLIJN 0900 - 204 204 0 WWW.AIDSFONDS.NL

